

Prise en charge douleurs dentaires à l'officine

Critères d'inclusion des patients

- 1 : Patient âgé de plus de 15 ans
- 2 : Douleur dentaire itérative (de 4 à 7/10 sur l'échelle de la douleur)

Critères de non-inclusion des patients

- 1 : Patient de moins de 15 ans
- 2 : Douleur permanente d'intensité > 7/10
- 3 : Altération de l'état général notamment si température > 38,5°C
- 4 : Grossesse avérée ou non exclue
- 5 : Immunodépression ou risque d'immunodépression
- 6 : Radiothérapie de la face
- 7 : Risque d'endocardite infectieuse
- 8 : Sinusite maxillaire
- 9 : Notion d'insuffisance rénale sévère (clairance < 30 mL/min)
- 10 : Antibiothérapie pour une autre pathologie
- 11 : Allergie ou contre-indications aux antibiotiques recommandés
- 12 : Gonflement étendu à l'œil et/ou au cou/gorge et/ou à la langue
- 13 : Difficulté à saliver/déglutir
- 14 : Saignement à la suite d'une intervention ou d'un choc
- 15 : Douleur liée à un choc, une dent qui bouge ou expulsée
- 16 : Antécédent de prise en charge par un protocole douleur dentaire il y a moins de 3 mois

2 types de douleurs : Gencive et/ou Dentaire

1. Douleurs au niveau de la gencive

a) Inflammatoire : gingivite

Gencives qui saignent
Douleurs localisées
+/- gonflement de la gencive
Douleurs entre 3 et 6 (échelle douleur)

→ **Paracétamol + Eludril Perio**

b) Infectieux : abcès parodontal

-Localisé
-Gonflement important
-Diffusion et irradiation
-Boule avec fistule et parfois point blanc suintant (pus)
-Caractéristique +++ : Boule douloureuse à l'appui avec ou sans suintement

→ **Antibiothérapie + Paracétamol + Eludril Perio**

Causes :

- Mauvaise hygiène dentaire
- Stress, fatigue
- Changement hormonaux
- Médicaments..

2. Douleurs dentaires

b) Carrie

« Troue » dans la dent
Douleur au froid

⇒ **Paracétamol + Eludril**

c) Nécrose

Le nerf de la dent se nécrose
Douleur à la mastication/pression
Douleur au chaud

⇒ **Antibiothérapie + Paracétamol + Eludril**

Ordonnance établie dans le cadre de l'autorisation du protocole de coopération local « **Prise en charge de la douleur dentaire des plus de 15 ans par le pharmacien d'officine** » au sein de la MSP du Square.

Chirurgien-dentiste-Délégant

Nom du Dr : BAUDET JEREMY
179 bd Jean Ossola
06700 St Laurent du Var
RPPS : 10101417474
Adeli : 064010382

Pharmacien d'officine - Délégué

Nom du Dr :
RPPS :

Date:

Patient:

Né(e)le:

Amoxicilline1g

Un comprimé matin et soir pendant 7 jours à prendre en milieu de repas

Si allergie amoxicilline :

Clindamycine300mg

Deux gélules matin et soir pendant 7 jours avec un grand verre d'eau. La prise doit être effectuée en position debout ou assise sans s'allonger dans les 30 min suivant l'administration.

Chlorhexidine 0.20%

Faire un bain de bouche 3 fois par jour après un brossage soigneux pendant 7jours

Paracétamol 1g

En cas de douleur, prendre un comprimé toutes les 6h au maximum, (maximum 4 fois par jour) pendant 7 jours

Signature et tampon :

Modalités de facturation sur LGPI :

- Prescripteur : Nom du titulaire selon les pharma
- Facturation des médicaments à la suite
- Scanner les documents nécessaires :
 - Critères d'exclusion
 - Recueil consentement patient
 - Ordonnance type (NAS commun → Protocole douleur dentaire MSP → « Ordo type à scanner »)

